

PROCEDURA ZA PACIJENTE ESHRE SMERNICE

- a) Svi pacijenti koji planiraju postupak BMPO treba da popune trijažni upitnik (mailom, telefonom, lično) dve nedelje pre početka postupka
- b) Ponovna trijaža oba partnera treba da bude urađena tokom stimulacije
- c) Procedura trijaže pacijenata radi se na isti način kao i trijaža osoblja. **Oba partnera moraju da prođu trijažu.** Pacijenti za koje se sumnja da su inficirani treba da urade test na SARS-CoV-2 IgM/IgG ili ekvivalentni test. Dodatno testiranje je moguće u skladu sa nacionalnim preporukama.
- d) Svi pacijenti koji su bili inficirani virusom Covid 19, moraju da pokažu dokument da su prošli ponovno testiranje i bili negativni- pre započinjanja postupka BMPO. Ukoliko su pacijenti bili na respiratornoj podršći u toku lečenja Covid 19, moraju da donesu dodatnu saglasnost za započinjanje postupka.

SCENARIO 1- UKLJUČIVANJE

- 1) Oba partnera na trijaži su niskog rizika; negativna klinička istorija, životni stil kompatibilan sa niskim/minimalnim rizikom za kontakt sa potencijalno inficiranim individuama
- 2) Oba pacijenta asimptomatska

SCENARIO 2- BITI OPREZAN

- 1) Pacijenti koji su se oporavili od COVID 19 infekcije i koji imaju potvrdu nadležene ustanove da su zdravi, treba da ponove SARS-CoV-2 IgM/IgG test pre započinjanja postupka
- 2) Ukoliko jedan /oba partnera imaju ne specifične simptome pre započinjanja stimulacije:
 - AA) Ponoviti trijažu na početku stimulacije
 - Ukoliko je negativna → nastaviti sa stimulacijom
 - Ukoliko simptomi perzistiraju → Ponoviti test SARS-CoV-2 IgM/IgG
 - ukoliko je IgM / IgG negativan → nastaviti stimulaciju
 - ukoliko je IgM/IgG pozitivan → odložiti postupak i uputiti na dalju procenu i testiranje
- 3) Pojava nespecifičnih simptoma tokom stimulacije
 - Uraditi test SARS-CoV-2 IgM/IgG
 - ukoliko je IgM / IgG negativan → nastaviti stimulaciju
 - ukoliko je IgM/IgG pozitivan → odložiti postupak i uputiti na dalju Procenu i testiranje

SCENARIO 3- ISKLJUČIVANJE

1) Ukoliko pacijent/partner pokazuje simptome COVID 19, odložiti postupak i uputiti na dalje lečenje i praćenje

Trijaža pacijenata smernice ESHRE

